



KARTA DLA PACJENTA

Voziberin (*Apixabanum*)

Karta dla Pacjenta

Pacjent/dziecko/opiekun zawsze powinien mieć tę kartę przy sobie.

Należy pokazać tę kartę farmaceutyce, dentyście oraz innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego przed rozpoczęciem leczenia.

Jestem leczony przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku Voziberin (*Apixabanum*) w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi.

Należy wypełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Masa ciała:

Dawkowanie: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Telefon do lekarza:

Informacja dla pacjentów/opiekunów:

- Lek Voziberin należy przyjmować/ podawać regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia porannej dawki należy przyjąć/podać ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym. Można ją przyjąć/ podać razem z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/podać wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować/ podawać dwóch dawek następnego ranka, lecz kontynuować stosowanie dawkowania dwa razy dziennie, zgodnie z zaleceniami, następnego dnia.
- Nie należy przerywać przyjmowania/ podawania leku Voziberin bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub zakrzepu krwi lub innych powikłań.
- Lek Voziberin pomaga w rozrzedzaniu krwi. Może to jednak zwiększyć ryzyko

Open Size: 60 x 224 mm

Font type: Arial Narrow, OCR-B 10 BT.

Font Size: 9pt

Version No: 02



Black

krwawienia.

- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień obejmują zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, bladość lub osłabienie, nagły silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, **należy natychmiast zgłosić się do lekarza**.
- W razie konieczności leczenia chirurgicznego lub innego inwazyjnego zabiegu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Voziberin.

{MMM YYYY}

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Lek Voziberin (*Apixabanum*) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Lek Voziberin może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy natychmiast przerwać leczenie.
- Leczenie lekiem Voziberin nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach, np. przedawkowanie oraz nagły zabieg chirurgiczny (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)) - patrz ChPL.
- Dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowane przeciwko czynnikowi Xa u dorosłych, jednak jego bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały ustalone u dzieci i młodzieży (patrz charakterystyka produktu leczniczego andeksanet alfa).

